

## سالفوفيروز شراب

اقرأ هذه النشرة بعناية لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك.  
هذا الدواء متاح بدون وصفة طبية. ومع ذلك، مازالت هناك حاجة للتناوله بعناية للحصول على افضل النتائج.  
حافظ على هذه النشرة قد تحتاج لقرائتها مره اخرى.  
اسأل الصيدلى اذا كنت بحاجة الى مزيد من المعلومات أو المشورة.  
يجب عليك الاتصال بالطبيب إذا ساءت الأعراض أو لم تتحسن.  
إذا كنت تحصل على أى آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو الصيدلى أو الممرضة. وهذا يشمل أى الآثار الجانبية المحتملة غير المدرجة فى النشرة.

فى هذه النشرة:

- 1- ماهو سالفوفيروز وفيه يستخدم.
- 2- قبل أن تتناول سالفوفيروز.
- 3- كيفية تناول سالفوفيروز.
- 4- الآثار الجانبية المحتملة.
- 5- كيفية تخزين سالفوفيروز.
- 6- مزيد من المعلومات.

### 1- ماهو سالفوفيروز وفيه يستخدم:

سالفوفيروز هو معدن مكمل يستخدم لعلاج نقص الزنك. شراب يحتوى على الماده النشطة كبريتات الزنك هيبتا هيدرات. كبريتات الزنك هيبتا هيدرات هى مصدر من الزنك، وهو عنصر اساسى ويشارك فى عدد من وظائف الانزيمات بالجسم.

### 2- قبل ان تتناول سالفوفيروز

لا تأخذ سالفوفيروز

-إذا كنت تعاني من فرط الحساسية لكبريتات الزنك هيبتا هيدرات أو أى من المكونات الأخرى لسالفوفيروز  
التحدث مع طبيبك إذا كان ينطبق عليك.

-إذا أخبرك طبيبك بأنك لا تتحمل بعض السكريات، فاتصل بطبيبك قبل تناول هذا المنتج الطبي.

### عناية خاصة مع سالفوفيروز:

-إذا كنت تعاني من مرض فى الكلى

إذا كان هذا ينطبق عليك فإنه من المهم أن تخبر طبيبك أو الصيدلى قبل تناول سالفوفيروز وطبيبك سوف يقرر ما يجب القيام به. اذا ما كان أمن بالنسبة لك تناول سالفوفيروز.

### تناول أدوية أخرى

يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلى إذا كنت تأخذ أو اتخذت مؤخرًا أى أدوية أخرى، بما فى ذلك الأدوية التى يتم الحصول عليها دون وصغة طبية.

هذا أمر مهم خاصة إذا كنت تأخذ أو اتخذت مؤخرًا أى مما يلى:

المضادات الحيوية التتراسيكلين (مثل أوكسيتيترا سيكلين أو الدوكسيسيكلين) تستخدم لعلاج بعض الالتهابات البكتيرية

-المضادات الحيوية الكينولون (مثل السبيروفلوكساسين , والليفوفلوكساسين,موكسيفلوكساسين,النورفلوكساسين و أوفلوكساسين) تستخدم لعلاج بعض الألتهايات البكتيرية

-تحضيرات ملح الكالسيوم

-مستحضرات الحديد

-بنسيلامين (التي تستخدم لعلاج التهابات المفاصل الروماتويدي ,ومرض ويلسون , و التهابات الكبد المناعى الذاتى زيادة حمض السيستين فى البول)

-تريبتين (المستخدم فى علاج مرض ويلسون)

### تناول سالفوفيروز مع الطعام والشراب

ينبغى أن تأخذ سالفوفيروز بعد وجبات الطعام

### الحمل والرضاعة الطبيعية

من غير المعروف سلامة سالفوفيروز اثناء الحمل . وقد تبين عبور الزنك الى المشيمة وموجود فى حليب الثدي عند الإناث التى تناولن مكملات الزنك . لا تأخذى هذا المنتج خلال فترة الحمل أو أثناء الرضاعة الطبيعية الا إذا اخبرك طبيبك بذلك.

إسألئ طبيبك أو الصيدلى للحصول على المشورة قبل اتخاذ أى دواء خلال فترة الحمل أو أثناء الرضاعة الطبيعية.

### القيادة واستخدام آلات

ليس من المتوقع أن يؤثر سالفوفيروز على القدرة على القيادة أو استخدام الآلات.

### 3-كيفية تناول سالفوفيروز

التناول: عن طريق الفم

الرضع دون سن 6 أشهر : 10ملجم من الزنك (2.5 مل) يوميا

أطفال فوق 6 أشهر : 20ملجم من الزنك (5 مل) يوميا

-يجب استمرار العلاج من 10الى 14 يوم لتجنب عودة الاسهال مرة اخرى

بالنسبة لنقص الزنك وغيرها من دواعى الاستعمال :-

-الأطفال أقل من 10كجم : 22.5ملجم من الزنك (5.6مل) يوميا فى جرعه مقسمة.

-الأطفال من 10-30 كجم : 22.5 ملجم من الزنك (5.6مل) 1-3 مرات يوميا.

-الكبار والأطفال فوق 30 كجم : 45 ملجم من الزنك (11.1 مل) 1-3 مرات يوميا أو موجهها من قبل الطبيب .

### إذا تناولت أكثر مما يجب من سالفوفيروز

إذا كنت تناولت أكثر مما يجب من سالفوفيروز اتصل بأقرب قسم طوارئ فى المستشفيات أو الطبيب على الفور

### إذا كنت قد نسيت أن تأخذ سالفوفيروز

إذا كنت قد نسيت أن تأخذ سالفوفيروز تناول الجرعه المقررة فى أقرب وقت عندما تتذكر استمر بعد ذلك بتناول الجرعة القادمة وفقا للتعليمات . لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

إذا كان لديك أى أسئلة أخرى عن استخدام هذا المنتج ,إسأل طبيبك أو الصيدلى.

### 4-الأثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية , يمكن لسالفوفيروز ان يتسبب فى أثار جانبية ,على الرغم من أن الجميع لا يحصل لهم .

وقد تم الإبلاغ عن الأثار الجانبية التالية:

-ألم فى البطن

- عسر الهضم
- غثيان
- القيء
- إسهال
- عدم الراحة فى المعدة
- التهيج
- صداع الرأس
- الخمول(شعور التعب)

#### **5-كيفية التخزين:**

يتم تخزينه فى درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية.

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

#### **6-المزيد من المعلومات**

على ماذا يحتوى سالفوفيروز

كل 5مل يحتوى على :-

المادة الفعالة : كبريتات الزنك هيبوتاهايدرات87.926 مجم مكافئ ل 20 مجم زنك

المواد الغير فعالة : سكارين صوديوم , سكروز , صوديوم سيترات دايهيدرات , سيتريك اسيد مونو هيدريت ,

نكهة الفراولة , نكهة الموز , جليسرين , ماء نقى

العبوة:

علبة كرتون تحتوى على زجاجه 120مللى ونشرة داخلية

**تصنيع: شركة أفروس فارما للصناعات الدوائية**